

## THÔNG BÁO

### Sâu bệnh hại lúa mùa năm 2024 và biện pháp phòng trừ

Hiện nay, trên đồng ruộng cây lúa đang ở giai đoạn đòng to đến trổ bông, trà muộn đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh. Trong những ngày vừa qua thời tiết có nắng mưa xen kẽ, ẩm độ không khí cao là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa.

#### 1. Sâu đục thân hai chấm.

Trưởng thành sâu đục thân đã vũ hóa và đẻ trứng trên cây lúa. Mật độ ổ trứng trung bình  $<0,05$  ổ/m<sup>2</sup>; cao 0,2 – 0,3 ổ/m<sup>2</sup>. Dự kiến sâu non sẽ nở rộ từ ngày 27/8 – 2/9/2024 và gây bông bạc trên trà lúa mùa trung trổ từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 và gây đánh héo trên trà lúa mùa muộn.

#### 2. Bệnh đốm sọc vi khuẩn

Bệnh đốm sọc vi khuẩn đã phát sinh trên đồng ruộng tỷ lệ trung bình 3-5% số lá, cao 10 – 15% số lá; cục bộ 30 – 40% số lá, cấp 3,5. Đặc biệt bị nặng ở các khu đồng thôn Đức Hậu, thôn Thượng, và rải rác ở các thôn trên địa bàn xã. Bệnh tiếp tục hại tăng sau các đợt mưa giông.

#### 3. Bệnh khô vằn hại lúa

Bệnh khô vằn tỷ lệ trung bình 5-7% đánh, ruộng cao 10-15% đánh, cục bộ 20-30% đánh, cấp bệnh 3-5. Bệnh hại nặng trên những ruộng lúa bón thừa đạm, xanh tốt, những ruộng cấy dày.

#### 4. Rầy nâu, rầy lưng trắng

Rầy đã phát sinh trên đồng ruộng với mật độ trung bình 30 - 50 con/m<sup>2</sup>, cao 150 – 300 con/m<sup>2</sup>, cục bộ 500-750 con/m<sup>2</sup>. Mật độ bọ rầy sẽ tiếp tục tăng mạnh từ nay đến cuối vụ và sẽ gây cháy cục bộ trên trà lúa mùa trung nếu không được phòng trừ kịp thời.

- Ngoài ra trên cây lúa còn có một số đối tượng dịch hại khác như: Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh lem lép hạt, chuột, .... xuất hiện và gây hại rải rác.

**Vậy UBND xã thông báo tới toàn thể nhân dân được biết**

**và đề nghị nhân dân:**

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng để sớm phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại.

+ **Đối với sâu đục thân:** phun thuốc phòng trừ sâu đục thân đối với diện tích có mật độ ổ trứng sâu cao, những diện tích lúa đang đòng to đến thấp thoi trổ 1-3% bông. Thời điểm phòng trừ sâu đục thân tốt nhất là giai đoạn lúa thấp thoi trổ.

- Sử dụng các loại thuốc như: Prevathon® 35WG, Virtako 40WG, Paxtox 95SP, Gà Nồi 95SP...

Lưu ý: Đối với những ruộng lúa thấp thoi trổ thì phun vào buổi chiều mát, tuyệt đối không phun vào buổi sáng làm ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn của hoa lúa. Nếu phun xong mà mưa to ngay thì bắt buộc phải phun lại.

+ **Đối với bệnh Đốm sọc vi khuẩn:** những diện tích lúa đã bị bệnh cần giữ nước thường xuyên trên ruộng để tăng khả năng chống chịu của cây; phun phòng trừ khi bệnh mới xuất hiện hoặc ngay sau khi mưa giông kết thúc bằng một trong các loại thuốc như: ARC – Clench 215WP, Leti Star 1SL, Xanthomix 20WWP, SieuSieu 250WP, Batocide 12WG, Reward 775 WP...

+ **Đối với bệnh khô vằn:** Phun phòng trừ những diện tích có tỷ lệ bệnh >20% số đánh bằng một trong các loại thuốc như: Nevo 330EC, Tilt super 300EC, Newsuper 330EC, Superone 300EC, .....

+ **Đối với bọ rầy:** Tổ chức phun thuốc phòng trừ ở những diện tích có mật độ cao trên 3.000 con/m<sup>2</sup>; bằng các loại thuốc như: Chess 50WG, Orgyram 70WP, Facetime 750WP, Hichespro 50WP, .....

Phun khi rầy tuổi 1, 2 sẽ cho hiệu quả cao.

**Chú ý:** - Phun đủ 25 - 30 lít nước thuốc đã pha/sào; nồng độ và liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì.

- Tuyệt đối không được dùng ống phụt để phun thuốc BVTV cho lúa.

**Nơi nhận:**

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Sóc Sơn (b/c);
- Các đ/c trưởng thôn, HTX (t/h);
- Đài truyền thanh xã (T/b);
- Hội Nông dân xã, Hội LHPN xã (t/t);
- CB phụ trách nông nghiệp, Khuyến nông xã (t/h);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Quách Văn Cường**